

Wybrane programy profilaktyczne w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych w województwie pomorskim w 2016 r. – kryteria realizacji i opis

LP	NAZWA PROGRAMU	GRUPA DOCELOWA		ŚWIADCZENIA	TRYB PRZYJMOWANIA
1.	<b>Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy</b>	Kobiety: <ul style="list-style-type: none"> <li>• w wieku 25-59 lat,</li> <li>• co 36 miesięcy,</li> <li>• co 12 miesięcy dla kobiet obciążonych grupą ryzyka (zakażonych wirusem HPV)</li> </ul>		Etap podstawowy <ul style="list-style-type: none"> <li>• pobranie materiału do badania cytologicznego</li> </ul>	Imienne zaproszenie
			Etap diagnostyczny: <ul style="list-style-type: none"> <li>• cytologia</li> </ul>		
			Etap pogłębionej diagnostyki: <ul style="list-style-type: none"> <li>• kolposkopia</li> </ul>		Skierowanie z etapu podstawowego
2.	<b>Program Profilaktyki Raka Piersi</b>	Kobiety: <ul style="list-style-type: none"> <li>• w wieku 50-69 lat</li> <li>• co 24 miesięcy</li> <li>• co 12 miesięcy dla kobiet obciążonych grupą ryzyka (wystąpił rak piersi w rodzinie, lub mutacje genu BRCA)</li> </ul>		Etap podstawowy <ul style="list-style-type: none"> <li>• mammografia</li> </ul>	Imienne zaproszenie
			Etap pogłębionej diagnostyki: <ul style="list-style-type: none"> <li>• mammografia uzupełniająca lub</li> <li>• USG piersi</li> <li>• biopsja cienko lub grubo igłowa</li> <li>• badanie cytologiczne lub histopatologiczne wycinka</li> </ul>		Skierowanie z etapu podstawowego
3.	<b>Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego</b>	<b>Populacja badana (w systemie oportunistycznym)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• co 10 lat</li> <li>• osoby w wieku 50 – 65 lat, bez objawów takich jak krwawienie z przewodu pokarmowego, biegunka lub zaparcie, które pojawiło się w ciągu ostatnich kilku miesięcy, a którego przyczyna nie jest znana, a także chudnięcie lub anemia bez znanej przyczyny; niezależnie od wywiadu rodzinnego;</li> <li>• osoby w wieku 40 – 65 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego;</li> </ul>	<b>Populacja badana (w systemie zapraszonym)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• osoby bez objawów klinicznych sugerujących raka jelita grubego w wieku 55 – 64 lat;</li> <li>• osoby z objawami choroby, jeśli otrzymały na nie zaproszenie.</li> </ul>	Kolonoskopia	Imienne zaproszenie